

Prefeitura Municipal de São José
Secretaria de Saúde

Processo Seletivo • Edital 001/2014

 <http://2014saojose.fepese.org.br>

Caderno de Prova



6 de abril



das 14 às 16 h



2 h de duração*



15 questões



CG Clínico Geral



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Específicos

(15 questões)

1. Nos quadros de demência, a principal etiologia em aproximadamente 50 a 60% dos casos é(são) a(s)/os:

- a. () Doença de Parkinson.
- b. (X) Doença de Alzheimer.
- c. () Doença de Huntington.
- d. () Infecções (Encefalite viral, HIV)
- e. () Transtornos nutricionais (deficiência de vitamina B, ácido fólico).

2. A cessação da ingestão crônica de álcool ou sua redução pode levar ao aparecimento de um conjunto de sinais e sintomas de descritos como Síndrome de Abstinência.

Os sintomas da Síndrome de Abstinência ao Álcool mais comumente encontrados são:

- a. (X) Tremores.
- b. () Convulsões.
- c. () Sudorese e palidez
- d. () Náuseas e vômitos.
- e. () Hiperatividades autonômicas.

3. As alternativas abaixo apresentam as complicações pulmonares decorrentes do uso agudo de crack, **exceto**:

- a. () Hemoptise.
- b. () Derrames pleurais.
- c. (X) Risco de tuberculose.
- d. () Dor torácica, dispneia, tosse seca.
- e. () Eliminação de sangue e/ou material escuro (resíduos da combustão).

4. Em relação à depressão, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Geralmente é um transtorno agudo sem características recorrentes.
- b. () Não é um transtorno incapacitante e permite a execução de atividades laborativas normais.
- c. () A depressão é menos frequente em mulheres.
- d. (X) A depressão é um problema frequente e a prevalência anual de depressão na população em geral varia entre 3 a 11%.
- e. () Em pacientes internados por qualquer doença física, a prevalência de depressão é menor pela maior atenção voltada à doença de base.

5. Em medicina baseada em evidências, o diagnóstico das doenças se baseia em vários níveis de evidências.

O reconhecimento imediato de um padrão de uma determinada doença é um exemplo de um raciocínio diagnóstico tipo:

- a. () Causal.
- b. () Aleatório.
- c. () Randômico.
- d. () Probabilístico.
- e. (X) Determinístico.

6. A infecção aguda pelo HIV, também chamada de síndrome da infecção retroviral aguda ou infecção primária, ocorre em cerca de 50% a 90% dos pacientes.

O tempo entre a exposição e os sintomas ocorrem mais frequentemente:

- a. (X) Entre cinco a 30 dias.
- b. () Após 90 dias.
- c. () Após 6 meses.
- d. () Após 2 anos.
- e. () Imediatamente após o contato com HIV.

7. A Constituição Federal e as Leis Complementares, ao instalarem o Sistema Único de Saúde no Brasil, montaram um arcabouço técnico jurídico de forma a permitir o acesso à saúde por toda a população, em todos os níveis de atendimento. Entretanto também se estabeleceu uma diretriz para resguardar esse acesso a populações de risco ou que necessitem de atenção especial.

Esse princípio é a:

- a. () Solidariedade.
 - b. (X) Equidade.
 - c. () Isonomia.
 - d. () Igualdade.
 - e. () Hierarquização.
-

8. No tratamento da sífilis secundária com manifestações cutâneas de roséola sífilítica, o tratamento de escolha é:

- a. () Penicilina procaína 200.000 unidades intramuscular de 12 em 12 horas por 7 dias.
 - b. () Penicilina procaína 400.000 unidades intramuscular de 12 em 12 horas por 7 dias.
 - c. () Penicilina benzatina 1.2000.000 unidades intramuscular profundo dose única.
 - d. () Penicilina benzatina 2.4000.000 unidades intramuscular profundo dose única.
 - e. (X) Penicilina benzatina 1.2000.000 unidades intramuscular profundo em cada nádega, repetido após 7 dias.
-

9. Crianças que chegam à emergência com quadro de tosse, dispneia com sibilância devido a broncoespasmo devem iniciar a terapia de resgate com:

- a. () Nebulização com corticoide inalatório a cada 20 minutos
- b. () Brometo de ipratrópio por nebulização com oxigênio.
- c. (X) Broncodilatadores beta-2-agonistas inalatório com espaçador a cada 20 minutos.
- d. () Nebulização com 3 ml de adrenalina a cada vinte minutos por 3 vezes.
- e. () Nebulização com corticoide inalatório associado a adrenalina a cada 20 minutos por 3 vezes.

10. Mulheres adultas jovens que se apresentam na emergência com quadro de disúria, polaciúria, cujos exames complementares demonstram a presença de infecção do trato urinário baixo, têm como principal agente etiológico envolvido:

- a. (X) *Escherichia coli*.
 - b. () *Diplococcus gonorrhoeae*.
 - c. () *Staphylococcus aureus*.
 - d. () *Chlamydia trachomatis*.
 - e. () *Ureaplasma urealyticum*.
-

11. Pacientes que se apresentam na emergência com episódios agudos de lesões vesiculares, dolorosas, localizadas no lábio em forma de cacho de uvas e com uma base eritematosa, têm como diagnóstico:

- a. () Candidíase oral.
 - b. () Herpes zoster.
 - c. (X) Herpes simples.
 - d. () Sífilis secundária.
 - e. () Queilite angular aguda.
-

12. Cefalexina, cefalotina e cefuroxima são antibióticos que pertencem à classe do(as):

- a. () Quinolonas
 - b. () Macrolídeos.
 - c. () Carbapenens.
 - d. (X) Beta-lactâmicos
 - e. () Aminoglicosídeos.
-

13. A flora vaginal normal da mulher abriga diversos agentes etiológicos que podem causar vulvovaginites, que normalmente habitam de forma assintomática o trato vaginal.

Porém ela é considerada uma doença sexualmente transmissível (DST) quando causada pela(o):

- a. (X) *Trichomonas vaginalis*.
- b. () *Gardnerella vaginalis*.
- c. () *Escherichia coli*.
- d. () *Candida albicans*.
- e. () *Entamoeba histolytica*.

14. As síndromes plurimetabólicas caracterizadas por alterações no metabolismo da glicose usualmente evoluem para diabetes mellitus tipo 2 (DM2), dependendo dos hábitos de vida, alimentação e predisposição genética ao longo da vida.

Uma glicemia igual ou superior a 140 e menor que 200 mg/dL, duas horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, caracteriza um(a):

- a. () Cetoacidose diabética.
- b. () Diabetes mellitus.
- c. () Glicemia normal.
- d. () Glicemia de jejum alterada.
- e. (X) Tolerância a glucose diminuída.

15. Pacientes com lesões de pele de longa evolução com alteração de sensibilidade, espessamento de nervo(s) periférico(s), acompanhado de alteração de sensibilidade, têm como principal hipótese diagnóstica:

- a. () Ectima.
- b. (X) Hanseníase.
- c. () Sífilis secundária.
- d. () Leishmaniose cutânea.
- e. () Púrpura trombocitopênica.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>